

## SCHEDA TECNICA

### 1. NOME COMMERCIALE: **ROOF**

Roof è una trappola a feromoni per il monitoraggio delle cocciniglie (*Aonidiella aurantii*, *Comstockaspis perniciosa*, *Planococcus citri*, *Planococcus ficus*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*).

Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente agricolo per un periodo di tempo definito.

### 2. CODICE PRODOTTO: **P-25008INFX**

### 3. IMMAGINE PRODOTTO:



### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Roof è una trappola per il monitoraggio delle cocciniglie, costituita da un tettuccio collato nella parte interna e da un erogatore di feromone specifico posizionato a distanza dal tettuccio per massimizzare la capacità di attrazione e cattura.

A seconda dell'insetto da monitorare, associare alla trappola il feromone specifico per una delle seguenti specie: *Aonidiella aurantii*, *Comstockaspis perniciosa*, *Planococcus citri*, *Planococcus ficus*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*.

#### **Una confezione di Roof contiene:**

- 9 tettucci collati
- 9 erogatori di feromone specie-specifico
- 3 supporti erogatore
- 3 fili guainati per appendere la trappola
- 1 spatola
- 1 tabella per rilevamento catture

**Colore:** come da immagine riportata

I prodotti InFarm PHERO LINE ISAGRO potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

## SCHEDA TECNICA

### 5. MODALITÀ D'USO:

Allestire la trappola, posizionando la capsula in gomma (erogatore) tramite l'apposito sostegno ed appendere Roof (corpo trappola ed erogatore) ad un'altezza di 1,5-2 metri da terra, preferibilmente in zone ombreggiate.

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

**Area di copertura teorica:** In pieno campo, si consiglia di posizionare 2-3 trappole per ettaro per il monitoraggio e fino a 15-20 per ettaro come metodo ausiliario di lotta. In serra, si consigliano 1-2 trappole per appezzamento.

**Periodo di monitoraggio consigliato:** Si consiglia di installare le trappole in primavera, in funzione della temperatura e della presenza degli insetti.

**Frequenza controlli consigliata:** controllare le trappole regolarmente, preferibilmente due volte a settimana. Sostituire l'erogatore dopo 4-5 settimane.

**Condizioni di stoccaggio:** Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

### 6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- **Confezione:** 9 erogatori di feromone + 9 tettucci collati (P-25008INFX)

### 7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.